

Arzneimittel	Eigenschaften
AkneGalen Gel 0,1 % Adapalen und Wasserhalti- ges Benzoylperoxid, entsprechend 2,5 % Benzoylperoxid	▪ pH-Wert: 4,0 ($\pm 1,0$) ▪ Wirkstoffe mikrofein suspendiert ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
AkneGalen forte Gel 0,3 % Adapalen und Wasserhalti- ges Benzoylperoxid, entsprechend 2,5 % Benzoylperoxid	▪ pH-Wert: 4,0 ($\pm 1,0$) ▪ Wirkstoffe mikrofein suspendiert ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
Betadermic Salbe 0,064% Betamethasondipropionat und 3% Salicylsäure	▪ wasserfrei (d.h. es ist kein pH-Wert zu berücksichtigen) ▪ wasseraufnahmefähig (jedoch nur sehr geringe Mengen) ▪ Wirkstoffe mikrofein suspendiert ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
BetaGalen Creme 0,122% Betamethasonvalerat	▪ pH-Wert: 4,0 ($\pm 0,5$), gepuffert ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 71% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit 2-Phenoxyethanol (= nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
BetaGalen Lösung 0,122% Betamethasonvalerat	▪ pH-Wert: ca. 4, gepuffert ▪ Wässrig-alkoholische Lösung (Grundlage bestehend aus: ca. 50% Gereinigtem Wasser und ca. 40% Isopropanol, sowie geringe Mengen Glycerol und Pro- pylenglycol) ▪ rel. Dichte (d_{20}^{20}): 0,95 ($\pm 0,02$) ▪ Wirkstoff gelöst ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
BetaGalen Lotion 0,122% Betamethasonvalerat	▪ pH-Wert: 4,0 ($\pm 0,5$), gepuffert ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 80% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit 2-Phenoxyethanol (= nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
BetaGalen Salbe 0,122% Betamethasonvalerat	▪ wasserfrei (d.h. es ist kein pH-Wert zu berücksichtigen) ▪ wasseraufnahmefähig (jedoch nur sehr geringe Mengen) ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
BetaGalen plus Fusidinsäure 2% Fusidinsäure und 0,1214% Be- tamethasonvalerat	▪ pH-Wert: 4,5 – 5,5 (gepuffert) ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 67% ▪ Wirkstoffe mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit Chlorocresol (nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate

Arzneimittel	Eigenschaften
ClobeGalen Creme 0.05% Clobetasolpropionat	▪ pH-Wert: 4,0 ($\pm 0,5$), gepuffert ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 71% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit 2-Phenoxyethanol (= nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
ClobeGalen Lösung 0.05% Clobetasolpropionat	▪ pH-Wert: ca. 4, gepuffert ▪ Wässrig-alkoholische Lösung (Grundlage bestehend aus: ca. 50% Gereinigtem Wasser und ca. 40% Isopropanol, sowie geringe Mengen Glycerol und Propylenglycol) ▪ rel. Dichte (d_{20}^{20}): 0,95 ($\pm 0,02$) ▪ Wirkstoff gelöst ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
ClobeGalen Lotion 0.05% Clobetasolpropionat	▪ pH-Wert: 4,0 ($\pm 0,5$), gepuffert ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 80% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit 2-Phenoxyethanol (= nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
ClobeGalen Salbe 0.05% Clobetasolpropionat	▪ wasserfrei (d.h. es ist kein pH-Wert zu berücksichtigen) ▪ wasseraufnahmefähig ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
ClotriGalen Creme 1% Clotrimazol	▪ pH-Wert: 5,5 - 7,0 (nicht gepuffert) ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 68% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit Benzylalkohol (nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
DuoGalen Creme 0,02% Flumetasonpivalat und 3% Triclosan	▪ pH-Wert: 5,0 - 7,0 (nicht gepuffert) ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 60% ▪ Wirkstoff Triclosan in der Fettphase gelöst, Wirkstoff Flumetasonpivalat mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit Phenoxyethanol (nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
FusiGalen Creme 2% Fusidinsäure	▪ pH-Wert: 4,0 - 5,2 (nicht gepuffert) ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 59% ▪ Wirkstoff Fusidinsäure mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit Kaliumsorbat (ionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 4 Wochen

Arzneimittel	Eigenschaften
HydroGalen Creme 1% Hydrocortison	▪ pH-Wert: 4,0 ($\pm 0,5$), gepuffert ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 71% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit 2-Phenoxyethanol (= nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
HydroGalen Lösung 1% Hydrocortison	▪ pH-Wert: ca. 7, nicht gepuffert ▪ Wässrig-alkoholische Lösung (Grundlage bestehend aus: ca. 50% Gereinigtem Wasser und ca. 40% Isopropanol, sowie geringe Mengen Glycerol und Propylenglycol) ▪ rel. Dichte (d_{20}^{20}): 0,95 ($\pm 0,02$) ▪ Wirkstoff gelöst ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
HydroGalen Lotion 1% Hydrocortison	▪ pH-Wert: 4,0 ($\pm 0,5$), gepuffert ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 80% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit 2-Phenoxyethanol (= nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
HydroGalen Salbe 1% Hydrocortison	▪ wasserfrei (d.h. es ist kein pH-Wert zu berücksichtigen) ▪ wasseraufnahmefähig ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
MetiGalen Lösung 0,1% Methylprednisolonaceponat	▪ wasserfrei (d.h. es ist kein pH-Wert zu berücksichtigen) ▪ Wirkstoff gelöst ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 4 Monate
MetiGalen Lotion 0,1% Methylprednisolonaceponat	▪ pH-Wert: 4,4-5,6 (nicht gepuffert) ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 70% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff in der Fettphase gelöst ▪ konserviert mit Benzylalkohol (nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
MetroGalen Gel 0,75% Metronidazol	▪ pH-Wert: 6,5 ($\pm 1,0$) (nicht gepuffert) ▪ Wassergehalt: 93% ▪ Wirkstoff gelöst ▪ konserviert mit Phenoxyethanol (nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate
MomeGalen Creme 0,1% Mometasonfuroat	▪ pH-Wert: 4,0-5,0 (gepuffert) ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 51% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert und z.T. gelöst ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: wie ungeöffnete Tube

Arzneimittel	Eigenschaften
MomeGalen Fett Creme 0,1% Mometasonfuroat	▪ kein pH-Wert messbar (nahezu wasserfrei) ▪ Grundlage bestehend aus einer inneren organisch-wässrigen Phase (überwiegend Hexylenglykol), in einer emulgierenden Fettphase ▪ Wirkstoff ist in der inneren Phase gelöst ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
MomeGalen Lösung 0,1% Mometasonfuroat	▪ pH-Wert: 4,0 - 5,0 (gepuffert) ▪ Alkoholisch-wässrige Lösung (Grundlage bestehend aus: ca. 40% Isopropanol sowie jeweils ca. 30% Propylenglycol und ca. 30% Gereinigtes Wasser) ▪ rel. Dichte (d_{20}^{20}): 0,95 ($\pm$ 0,02) ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
MomeGalen Salbe 0,1% Mometasonfuroat	▪ kein pH-Wert messbar (nahezu wasserfrei) ▪ Grundlage bestehend aus einer inneren organisch-wässrigen Phase (überwiegend Hexylenglykol), in einer Fettphase (überwiegend Vaseline) ▪ Wirkstoff ist in der inneren Phase gelöst ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
PrednicarbGalen Creme 0,25% Prednicarbat	▪ pH-Wert: 5,0 - 6,0 (nicht gepuffert) ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 67% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff in der Fettphase gelöst ▪ konserviert mit Benzylalkohol (nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
PrednicarbGalen Fett Creme 0,25% Prednicarbat	▪ kein pH-Wert messbar ▪ W/O-Emulsion ▪ Wassergehalt: 30% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff in der Fettphase gelöst ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
PrednicarbGalen Salbe 0,25% Prednicarbat	▪ Wasserfrei (d.h. es ist kein pH-Wert zu berücksichtigen) ▪ Wasseraufnahmefähig ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff in der Fettphase gelöst ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
TriamGalen Creme 0,1% Triamcinolonacetonid	▪ pH-Wert: 4,0 ($\pm$ 0,5), gepuffert ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 71% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit 2-Phenoxyethanol (= nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate

Arzneimittel	Eigenschaften
TriamGalen Lösung 0,1% Triamcinolonacetonid	▪ pH-Wert: ca. 4, gepuffert ▪ Wässrig-alkoholische Lösung (Grundlage bestehend aus: ca. 50% Gereinigtem Wasser und ca. 40% Isopropanol, sowie geringe Mengen Glycerol und Propylenglycol) ▪ rel. Dichte (d_{20}^{20}): 0,95 ($\pm$ 0,02) ▪ Wirkstoff gelöst ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
TriamGalen Lotion 0,1% Triamcinolonacetonid	▪ pH-Wert: 4,0 ($\pm$ 0,5), gepuffert ▪ O/W-Emulsion ▪ Wassergehalt: 80% ▪ nichtionische Emulgatoren ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ konserviert mit 2-Phenoxyethanol (= nichtionisch) ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate
TriamGalen Salbe 0,1% Triamcinolonacetonid	▪ wasserfrei (d.h. es ist kein pH-Wert zu berücksichtigen) ▪ wasseraufnahmefähig ▪ Wirkstoff mikrofein suspendiert ▪ ohne Konservierungsmittel ▪ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate